



HRVATSKI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNU
SAVJETODAVNU SLUŽBU



TRAVNJAŠTVO I OVČARSTVO

Livade i pašnjaci dugotrajne su travnjačke površine nastale prirodnim putem ili zasijavanjem, a koriste se košnjom ili napasivanjem.



Zasijani travnjak

PRIRODNI - ZASIJANI TRAVNJACI

U ovčarskoj proizvodnji prirodni travnjaci osnovni su izvor voluminozne hrane, bez obzira na način korištenja pašom-košnjom ili kombinirano. Bez obzira na način nastanka i korištenja travnjaka, na njima moramo provoditi agrotehničke mjere i pridržavati se pravilnoga načina korištenja.

GNOJIDBA: Gnojidbom najviše utječemo na količinu i kvalitetu proizvedene krme na travnjacima. Travnjaci se mogu gnojiti mineralnim ili organskim gnojivima.

MINERALNA GNOJIVA: Od mineralnih gnojiva gnoji se kompleksnim gnojivima formulacije NPK-a 8-26-26 ili 7-20-30 ili nekim sličnim, i to u rano proljeće prije kretanja vegetacije u količini 300 do 400 kg/ha.

KAN - kao izvor dušika daje se u proljeće početkom kretanja vegetacije u količini 200 kg/ha, a kroz sezonu korištenja travnjaka daju se poslije svakoga otkosa ili preseljenja stoke na drugi pregon, 100 do 150 kg/ha.

ORGANSKA GNOJIVA: Od organskih gnojiva travnjaci se gnoje zrelim stajskim gnojem ili gnojovkom, uglavnom nakon sezone korištenja travnjaka. Kod primjene organskih gnojiva mora se paziti da ne nastane onečišćenje okoliša, odnosno štetni utjecaj na okoliš.



MJERE UREĐENJA - NJEGE TRAVNJAKA

Mjere uređenja, njegе travnjaka obuhvaćaju čišćenje travnjaka nakon korištenja pašom, na taj način da se pokose nepopasene površine i tako se sprijeći širenje nepoželjnih biljnih vrsta. Nakon košnje nepopasenih površina i uklanjanja biljnih ostataka treba obaviti prihranu te prema potrebi drljanje travnjaka lakin drljačama da se poravnaju krtičnjaci, ravnomjernije rastrese stajski gnoj i prozrači tratinu. Uz ove radove, možemo obaviti dosijavanje travnjaka bilo zbog djelomičnoga propadanja tratine ili radi poboljšanja kvalitete travnjaka sjetvom poželjnih travnih ili djetelinskih vrsta.

PRAVILAN NAČIN KORIŠTENJA: Važno je naglasiti bitnu razliku između korištenja pašnjaka i livada, koji zajedno tvore travnjake.

Korištenje pašnjaka

Pašnjaci, napose pregonski se obično koriste pašno - košnim sustavom, a to znači da se jedna površina napasuјe, a ostale se kose. Da se ne radi tako, tratina u djelu pašnjaka koji se ne napasuјe prerasla bi, izgubila bi kvalitetu, a bio bi onemogućen porast nove tratine. Životinje se na pašnjak puštaju kada tratinu poraste na 15 do 20 cm. Nakon korištenja dijela pašnjaka provode se opisane agrotehničke mjere na pašnjaku.

Korištenje livada

Livade se kose cijelom površinom i koriste za zeleno, sijeno ili sjenažu. Tratina na livadama kosi se u visini 40-ak centimetara, pod kraj vegetativne faze. Nakon skidanja otkosa obavljaju se prihrana.

Primjenjene agrotehničke mjere gospodarenja livadama i pašnjacima omogućavaju visoke prinose kvalitetne voluminozne krme.



Zasijani travnjak

Autor: VLADO KUMPOVIĆ, dipl. inž. agr.

Za podrobnije informacije obratite se savjetniku HZPSS

Odgovorni urednik: dr. sc. Ivan Katalinić

Grafička priprema: Zdravko Tušek, dipl. inž. agr.

Tisk: FiLeDaTa, Zagreb

Nakladnik:

Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu

Kačićeva 9/III • 10 000 Zagreb

telefon: (01) 48 82 700 • fax: (01) 48 82 701

e-mail: hzpss@hzpss.hr

http://www.hzpss.hr